

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

H26/04/08

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージⅠ	0.8	1	128
	ステージⅡ	8.3	4	48
	ステージⅢ	0.0	0	35
	ステージⅣ	17.0	32	188
	不明	10.4	22	212
	全体	9.7	59	611
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	27
	ステージⅠ	0.0	0	53
	ステージⅡ	0.0	0	59
	ステージⅢ	2.8	3	106
	ステージⅣ	9.5	17	179
	不明	7.2	15	208
	全体	5.5	35	632
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	15
	ステージⅠ	0.0	0	34
	ステージⅡ	2.2	1	45
	ステージⅢ	1.6	1	62
	ステージⅣ	9.1	7	77
	不明	11.7	11	94
	全体	6.1	20	327
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	2.2	2	92
	ステージⅡ	5.7	2	35
	ステージⅢ	6.1	7	115
	ステージⅣ	16.9	43	255
	不明	13.2	49	372
	全体	11.8	103	870
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1.4	1	74
	KillipⅡ	9.1	6	66
	KillipⅢ	17.9	5	28
	KillipⅣ	56.4	22	39
	不明	68.0	17	25
	全体	22.0	51	232
肺炎	軽症	3.4	14	407
	中等症	5.9	9	152
	重症	15.3	132	862
	不明	0.8	5	605
	全体	7.9	160	2026
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	437
	不明	N/A	0	0
	全体	0.0	0	437
脳梗塞	JCS 0-1	2.7	15	553
	JCS 2-3	7.5	12	160
	JCS 10-100	24.7	22	89
	JCS 200-300	46.4	13	28
	不明	7.1	1	14
	全体	7.5	63	844
脳出血	JCS 0-1	3.4	5	147
	JCS 2-3	2.7	2	75
	JCS 10-100	12.6	11	87
	JCS 200-300	55.6	45	81
	不明	16.7	2	12
	全体	16.2	65	402
糖尿病	重症度の指標なし	3.1	14	458
	全体	3.1	14	458
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2.4	8	330
	全体	2.4	8	330
胃潰瘍	重症度の指標なし	2.0	3	149
	全体	2.0	3	149
急性腸炎	重症度の指標なし	0.3	2	651
	全体	0.3	2	651

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

H26/04/08

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	309
	全体	0.0	0	309
胆石症	重症度の指標なし	0.6	4	685
	全体	0.6	4	685
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	122
	全体	0.0	0	122
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	595
	全体	0.0	0	595
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	61
	全体	0.0	0	61
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	219
	全体	0.0	0	219
狭心症	重症度の指標なし	0.3	4	1181
	全体	0.3	4	1181
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	287
	全体	0.0	0	287
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	8
	ステージⅠ	0.0	0	2
	ステージⅡ	0.0	0	101
	ステージⅢ	0.0	0	9
	ステージⅣ	25.0	4	16
	不明	2.7	4	147
	全体	2.8	8	283
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	219
	全体	0.0	0	219
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	463
	全体	0.0	0	463