

■死亡率(重症度別)【第1四半期】

H26/04/08

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージⅠ	0.9	1	108
	ステージⅡ	4.5	2	44
	ステージⅢ	8.5	4	47
	ステージⅣ	16.6	32	193
	不明	10.1	23	227
	全体	10.0	62	619
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	25
	ステージⅠ	1.8	1	55
	ステージⅡ	1.1	1	87
	ステージⅢ	2.0	2	102
	ステージⅣ	8.2	14	171
	不明	8.4	17	202
	全体	5.5	35	642
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	8
	ステージⅠ	0.0	0	22
	ステージⅡ	0.0	0	44
	ステージⅢ	3.2	2	62
	ステージⅣ	13.9	10	72
	不明	4.0	3	75
	全体	5.3	15	283
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	1.2	1	82
	ステージⅡ	2.7	1	37
	ステージⅢ	10.6	13	123
	ステージⅣ	20.8	33	159
	不明	10.7	44	412
	全体	11.3	92	813
急性心筋梗塞	KillipⅠ	2.1	2	95
	KillipⅡ	2.7	2	74
	KillipⅢ	11.1	2	18
	KillipⅣ	50.0	13	26
	不明	70.8	17	24
	全体	15.2	36	237
肺炎	軽症	2.0	7	355
	中等症	0.7	1	140
	重症	14.4	102	707
	不明	0.6	5	791
	全体	5.8	115	1993
喘息	重症度の指標なし	0.4	2	501
	不明	N/A	0	0
	全体	0.4	2	501
脳梗塞	JCS 0-1	3.2	18	563
	JCS 2-3	7.3	12	164
	JCS 10-100	18.0	16	89
	JCS 200-300	36.0	9	25
	不明	33.3	5	15
	全体	7.0	60	856
脳出血	JCS 0-1	3.8	6	160
	JCS 2-3	7.2	5	69
	JCS 10-100	15.0	9	60
	JCS 200-300	60.7	37	61
	不明	36.4	4	11
	全体	16.9	61	361
糖尿病	重症度の指標なし	0.9	5	559
	全体	0.9	5	559
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.6	2	308
	全体	0.6	2	308
胃潰瘍	重症度の指標なし	4.0	7	175
	全体	4.0	7	175
急性腸炎	重症度の指標なし	0.8	6	787
	全体	0.8	6	787

■死亡率(重症度別)【第1四半期】

H26/04/08

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	344
	全体	0.0	0	344
胆石症	重症度の指標なし	0.3	2	694
	全体	0.3	2	694
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	109
	全体	0.0	0	109
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	676
	全体	0.0	0	676
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	61
	全体	0.0	0	61
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	214
	全体	0.0	0	214
狭心症	重症度の指標なし	0.1	1	1147
	全体	0.1	1	1147
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	365
	全体	0.0	0	365
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	16
	ステージI	0.0	0	13
	ステージII	0.0	0	75
	ステージIII	0.0	0	18
	ステージIV	11.8	2	17
	不明	5.0	8	159
	全体	3.4	10	298
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	173
	全体	0.0	0	173
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	501
	全体	0.0	0	501