

# ■死亡率(重症度別)【第2四半期】

H26/04/08

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージⅠ	0.9	1	117
	ステージⅡ	3.9	2	51
	ステージⅢ	10.8	4	37
	ステージⅣ	16.0	29	181
	不明	10.0	23	230
	全体	9.6	59	616
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	15
	ステージⅠ	0.0	0	66
	ステージⅡ	2.0	2	99
	ステージⅢ	1.8	2	112
	ステージⅣ	8.1	16	197
	不明	4.9	9	183
	全体	4.3	29	672
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	7
	ステージⅠ	0.0	0	36
	ステージⅡ	2.1	1	48
	ステージⅢ	1.3	1	77
	ステージⅣ	9.8	8	82
	不明	5.3	5	95
	全体	4.3	15	345
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	3.2	3	93
	ステージⅡ	11.9	5	42
	ステージⅢ	4.1	5	121
	ステージⅣ	18.8	40	213
	不明	13.0	60	462
	全体	12.1	113	932
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1.2	1	82
	KillipⅡ	1.2	1	81
	KillipⅢ	13.3	2	15
	KillipⅣ	58.6	17	29
	不明	75.0	6	8
	全体	12.6	27	215
肺炎	軽症	2.9	10	341
	中等症	5.2	6	115
	重症	17.7	88	497
	不明	0.3	2	715
	全体	6.4	106	1668
喘息	重症度の指標なし	0.4	2	480
	不明	N/A	0	0
	全体	0.4	2	480
脳梗塞	JCS 0-1	1.1	7	625
	JCS 2-3	6.5	8	124
	JCS 10-100	18.1	15	83
	JCS 200-300	30.0	6	20
	不明	23.1	3	13
	全体	4.5	39	865
脳出血	JCS 0-1	3.6	4	110
	JCS 2-3	2.2	1	45
	JCS 10-100	15.1	8	53
	JCS 200-300	68.9	31	45
	不明	60.0	6	10
	全体	19.0	50	263
糖尿病	重症度の指標なし	0.6	3	527
	全体	0.6	3	527
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2.3	7	308
	全体	2.3	7	308
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	140
	全体	0.0	0	140
急性腸炎	重症度の指標なし	0.2	1	503
	全体	0.2	1	503

# ■死亡率(重症度別)【第2四半期】

H26/04/08

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	417
	全体	0.0	0	417
胆石症	重症度の指標なし	0.4	3	758
	全体	0.4	3	758
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	125
	全体	0.0	0	125
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	639
	全体	0.0	0	639
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	71
	全体	0.0	0	71
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	232
	全体	0.0	0	232
狭心症	重症度の指標なし	0.5	5	1038
	全体	0.5	5	1038
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	414
	全体	0.0	0	414
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	12
	ステージI	0.0	0	1
	ステージII	0.0	0	83
	ステージIII	4.8	1	21
	ステージIV	21.4	6	28
	不明	4.9	6	123
	全体	4.9	13	268
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	202
	全体	0.0	0	202
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	582
	全体	0.0	0	582