



## ■死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
気管支および肺の悪 性新生物	ステージ0	0.0	0	4	0.0	0.0
	ステージI	2.4	9	371	15.4	1.6
	ステージII	6.4	10	157	24.5	3.9
	ステージIII	8.7	41	473	28.2	2.5
	ステージIV	17.1	150	878	37.7	2.5
	不明	12.5	210	1681	33.1	1.6
	全体	11.8	420	3564	32.2	1.1



## ■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
急性心筋梗塞	Killip I	1.8	6	334	13.3	1.4
	Killip II	3.9	11	282	19.4	2.3
	Killip III	19.5	17	87	39.9	8.5
	Killip IV	52.0	65	125	50.2	8.9
	不明	68.9	51	74	46.6	10.8
	全体	16.6	150	902	37.3	2.4



## ■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
脳出血	JCS 0-1	2.8	16	570	16.5	1.4
	JCS 2-3	3.4	9	262	18.2	2.2
	JCS 10-100	14.1	36	256	34.8	4.3
	JCS 200-300	61.1	165	270	48.8	5.9
	不明	31.0	13	42	46.8	14.6
	全体	17.1	239	1400	37.6	2.0

