

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

H26/07/18

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージⅠ	0.0	0	203
	ステージⅡ	7.0	5	71
	ステージⅢ	5.9	4	68
	ステージⅣ	18.3	39	213
	不明	8.5	35	412
	全体	8.6	83	967
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	38
	ステージⅠ	0.9	1	114
	ステージⅡ	1.8	2	112
	ステージⅢ	3.8	6	159
	ステージⅣ	10.7	21	197
	不明	5.3	20	376
	全体	5.0	50	996
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	10
	ステージⅠ	2.3	1	44
	ステージⅡ	1.5	1	65
	ステージⅢ	2.7	3	111
	ステージⅣ	6.9	8	116
	不明	4.2	7	168
	全体	3.9	20	514
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	1.7	2	120
	ステージⅡ	2.5	1	40
	ステージⅢ	9.6	14	146
	ステージⅣ	21.2	67	316
	不明	12.8	74	577
	全体	13.2	158	1199
急性心筋梗塞	KillipⅠ	3.3	3	91
	KillipⅡ	3.9	3	76
	KillipⅢ	13.0	3	23
	KillipⅣ	50.0	17	34
	不明	50.0	11	22
	全体	15.0	37	246
肺炎	軽症	2.9	13	456
	中等症	5.0	9	179
	重症	14.6	118	809
	不明	0.2	1	471
	全体	7.4	141	1915
喘息	重症度の指標なし	0.1	1	715
	不明	N/A	0	0
	全体	0.1	1	715
脳梗塞	JCS 0-1	2.3	17	730
	JCS 2-3	6.8	10	147
	JCS 10-100	18.5	15	81
	JCS 200-300	37.9	11	29
	不明	14.3	3	21
	全体	5.6	56	1008
脳出血	JCS 0-1	4.9	7	142
	JCS 2-3	2.0	1	49
	JCS 10-100	10.2	6	59
	JCS 200-300	71.6	48	67
	不明	33.3	2	6
	全体	19.8	64	323
糖尿病	重症度の指標なし	0.9	6	697
	全体	0.9	6	697
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2.7	12	437
	全体	2.7	12	437
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.5	3	197
	全体	1.5	3	197
急性腸炎	重症度の指標なし	0.5	4	730
	全体	0.5	4	730

■ 死亡率(重症度別)【第2四半期】

H26/07/18

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.4	2	536
	全体	0.4	2	536
胆石症	重症度の指標なし	0.5	5	972
	全体	0.5	5	972
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	144
	全体	0.0	0	144
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1227
	全体	0.0	0	1227
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	87
	全体	0.0	0	87
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	342
	全体	0.0	0	342
狭心症	重症度の指標なし	0.1	2	1563
	全体	0.1	2	1563
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	450
	全体	0.0	0	450
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	9
	ステージⅠ	0.0	0	6
	ステージⅡ	0.0	0	132
	ステージⅢ	0.0	0	26
	ステージⅣ	12.1	4	33
	不明	5.6	10	178
	全体	3.6	14	384
膝関節症	重症度の指標なし	0.3	1	288
	全体	0.3	1	288
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	750
	全体	0.0	0	750