

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

H27/08/07

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージⅠ	0.8	2	245
	ステージⅡ	7.0	6	86
	ステージⅢ	4.1	2	49
	ステージⅣ	16.2	42	260
	不明	11.4	42	369
	全体	9.3	94	1009
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	41
	ステージⅠ	0.0	0	84
	ステージⅡ	1.7	2	116
	ステージⅢ	2.0	3	150
	ステージⅣ	6.8	15	221
	不明	10.5	33	315
	全体	5.7	53	927
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	12
	ステージⅠ	2.2	1	46
	ステージⅡ	1.5	1	67
	ステージⅢ	1.0	1	96
	ステージⅣ	7.8	9	116
	不明	11.5	17	148
	全体	6.0	29	485
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	3.2	3	94
	ステージⅡ	5.3	2	38
	ステージⅢ	13.0	19	146
	ステージⅣ	20.7	66	319
	不明	13.0	68	523
	全体	14.1	158	1120
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1.5	2	132
	KillipⅡ	7.0	5	71
	KillipⅢ	18.2	4	22
	KillipⅣ	48.6	18	37
	不明	33.3	6	18
	全体	12.5	35	280
肺炎	軽症	1.5	7	455
	中等症	10.5	18	171
	重症	14.4	119	826
	不明	0.6	3	518
	全体	7.5	147	1970
喘息	重症度の指標なし	0.2	1	545
	不明	N/A	0	0
	全体	0.2	1	545
脳梗塞	JCS 0-1	2.2	16	729
	JCS 2-3	6.6	11	167
	JCS 10-100	22.5	23	102
	JCS 200-300	40.0	10	25
	不明	10.0	2	20
	全体	5.9	62	1043
脳出血	JCS 0-1	3.7	6	164
	JCS 2-3	8.9	5	56
	JCS 10-100	17.5	11	63
	JCS 200-300	64.2	43	67
	不明	33.3	4	12
	全体	19.1	69	362
糖尿病	重症度の指標なし	0.9	6	694
	全体	0.9	6	694
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.5	2	440
	全体	0.5	2	440
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	159
	全体	0.0	0	159
急性腸炎	重症度の指標なし	0.5	3	659
	全体	0.5	3	659

■ 死亡率(重症度別)【第2四半期】

H27/08/07

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	516
	全体	0.0	0	516
胆石症	重症度の指標なし	0.9	9	1036
	全体	0.9	9	1036
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	122
	全体	0.0	0	122
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1507
	全体	0.0	0	1507
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	75
	全体	0.0	0	75
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	348
	全体	0.0	0	348
狭心症	重症度の指標なし	0.4	6	1694
	全体	0.4	6	1694
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	414
	全体	0.0	0	414
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	8
	ステージⅠ	0.0	0	4
	ステージⅡ	0.7	1	136
	ステージⅢ	0.0	0	22
	ステージⅣ	18.2	4	22
	不明	9.4	21	223
	全体	6.3	26	415
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	266
	全体	0.0	0	266
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	741
	全体	0.0	0	741