

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

H28/05/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	4
	ステージⅠ	2.0	3	147
	ステージⅡ	8.1	3	37
	ステージⅢ	6.9	2	29
	ステージⅣ	11.4	16	140
	不明	11.9	25	210
	全体	8.6	49	567
結腸の悪性新生物	ステージ0	3.2	1	31
	ステージⅠ	0.0	0	78
	ステージⅡ	4.7	4	85
	ステージⅢ	0.7	1	135
	ステージⅣ	8.7	14	161
	不明	8.3	20	240
	全体	5.5	40	730
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	12
	ステージⅠ	1.9	1	52
	ステージⅡ	1.6	1	61
	ステージⅢ	2.4	2	83
	ステージⅣ	2.7	3	110
	不明	7.8	13	167
	全体	4.1	20	485
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	5.3	3	57
	ステージⅡ	4.0	1	25
	ステージⅢ	10.1	10	99
	ステージⅣ	24.8	40	161
	不明	12.6	38	302
	全体	14.3	92	644
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1.1	1	90
	KillipⅡ	7.2	5	69
	KillipⅢ	25.0	5	20
	KillipⅣ	58.3	14	24
	不明	38.1	8	21
	全体	14.7	33	224
肺炎	軽症	0.4	2	459
	中等症	8.1	16	198
	重症	15.4	130	843
	不明	1.1	7	619
	全体	7.3	155	2119
喘息	重症度の指標なし	0.3	1	331
	不明	N/A	0	0
	全体	0.3	1	331
脳梗塞	JCS 0-1	3.4	18	524
	JCS 2-3	6.1	10	163
	JCS 10-100	16.7	12	72
	JCS 200-300	42.1	8	19
	不明	38.5	5	13
	全体	6.7	53	791
脳出血	JCS 0-1	5.6	6	108
	JCS 2-3	7.1	4	56
	JCS 10-100	14.0	7	50
	JCS 200-300	70.9	39	55
	不明	22.2	2	9
	全体	20.9	58	278
糖尿病	重症度の指標なし	1.2	6	511
	全体	1.2	6	511
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.4	5	359
	全体	1.4	5	359
胃潰瘍	重症度の指標なし	2.4	3	124
	全体	2.4	3	124
急性腸炎	重症度の指標なし	0.0	0	455

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

H28/05/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
	全体	0.0	0	455
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	285
	全体	0.0	0	285
胆石症	重症度の指標なし	0.8	6	745
	全体	0.8	6	745
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	60
	全体	0.0	0	60
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1003
	全体	0.0	0	1003
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	68
	全体	0.0	0	68
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	143
	全体	0.0	0	143
狭心症	重症度の指標なし	0.3	3	963
	全体	0.3	3	963
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	192
	全体	0.0	0	192
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージI	0.0	0	61
	ステージII	1.0	1	100
	ステージIII	0.0	0	12
	ステージIV	7.1	1	14
	不明	5.8	11	190
	全体	3.4	13	380
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	178
	全体	0.0	0	178
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	391
	全体	0.0	0	391