

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

H28/05/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	11.1	1	9
	ステージI	1.2	2	168
	ステージII	8.8	3	34
	ステージIII	11.6	5	43
	ステージIV	13.2	20	152
	不明	11.0	33	300
	全体	9.1	64	706
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	32
	ステージI	0.0	0	75
	ステージII	2.6	3	115
	ステージIII	2.4	4	167
	ステージIV	10.1	20	198
	不明	5.1	15	292
	全体	4.8	42	879
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	16
	ステージI	4.2	2	48
	ステージII	1.6	1	63
	ステージIII	2.7	2	75
	ステージIV	9.3	14	151
	不明	4.9	9	184
	全体	5.2	28	537
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージI	0.0	0	62
	ステージII	8.1	3	37
	ステージIII	10.7	12	112
	ステージIV	19.8	39	197
	不明	14.9	58	388
	全体	14.0	112	798
急性心筋梗塞	Killip I	1.5	2	132
	Killip II	5.0	3	60
	Killip III	17.4	4	23
	Killip IV	58.1	25	43
	不明	41.9	13	31
	全体	16.3	47	289
肺炎	軽症	1.9	10	517
	中等症	7.0	12	172
	重症	17.0	138	810
	不明	0.6	5	869
	全体	7.0	165	2368
喘息	重症度の指標なし	0.5	3	588
	不明	N/A	0	0
	全体	0.5	3	588
脳梗塞	JCS 0-1	3.3	20	602
	JCS 2-3	5.7	10	174
	JCS 10-100	13.6	12	88
	JCS 200-300	21.4	3	14
	不明	18.8	3	16
	全体	5.4	48	894
脳出血	JCS 0-1	0.7	1	135
	JCS 2-3	6.3	5	79
	JCS 10-100	23.0	17	74
	JCS 200-300	63.5	40	63
	不明	50.0	4	8
	全体	18.7	67	359
糖尿病	重症度の指標なし	1.2	6	495
	全体	1.2	6	495
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.6	6	383
	全体	1.6	6	383
胃潰瘍	重症度の指標なし	3.4	5	148
	全体	3.4	5	148
急性腸炎	重症度の指標なし	0.3	2	615

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

H28/05/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
	全体	0.3	2	615
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	382
	全体	0.0	0	382
胆石症	重症度の指標なし	1.1	11	974
	全体	1.1	11	974
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	99
	全体	0.0	0	99
白内障	重症度の指標なし	0.1	1	1344
	全体	0.1	1	1344
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	74
	全体	0.0	0	74
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	187
	全体	0.0	0	187
狭心症	重症度の指標なし	0.2	3	1313
	全体	0.2	3	1313
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	279
	全体	0.0	0	279
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	13
	ステージI	0.0	0	52
	ステージII	0.0	0	155
	ステージIII	0.0	0	19
	ステージIV	13.2	5	38
	不明	6.5	12	186
	全体	3.7	17	463
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	239
	全体	0.0	0	239
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	579
	全体	0.0	0	579