

# ■死亡率(重症度別)【第1四半期】

H29/02/07

|               |             | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---------------|-------------|--------|----------|--------|
| 胃の悪性新生物       | ステージ0       | 0.0    | 0        | 6      |
|               | ステージI       | 1.9    | 3        | 158    |
|               | ステージII      | 2.5    | 1        | 40     |
|               | ステージIII     | 10.6   | 5        | 47     |
|               | ステージIV      | 16.4   | 26       | 159    |
|               | 不明          | 13.8   | 36       | 261    |
|               | 全体          | 10.6   | 71       | 671    |
| 結腸の悪性新生物      | ステージ0       | 0.0    | 0        | 24     |
|               | ステージI       | 0.0    | 0        | 92     |
|               | ステージII      | 2.7    | 3        | 112    |
|               | ステージIII     | 1.1    | 2        | 177    |
|               | ステージIV      | 4.6    | 10       | 217    |
|               | 不明          | 6.7    | 20       | 297    |
|               | 全体          | 3.8    | 35       | 919    |
| 直腸の悪性新生物      | ステージ0       | 0.0    | 0        | 8      |
|               | ステージI       | 2.0    | 1        | 51     |
|               | ステージII      | 0.0    | 0        | 52     |
|               | ステージIII     | 5.4    | 5        | 93     |
|               | ステージIV      | 1.7    | 2        | 116    |
|               | 不明          | 5.0    | 11       | 218    |
|               | 全体          | 3.5    | 19       | 538    |
| 気管支および肺の悪性新生物 | ステージ0       | N/A    | 0        | 0      |
|               | ステージI       | 3.4    | 2        | 59     |
|               | ステージII      | 13.6   | 3        | 22     |
|               | ステージIII     | 16.9   | 14       | 83     |
|               | ステージIV      | 22.3   | 40       | 179    |
|               | 不明          | 12.2   | 41       | 336    |
|               | 全体          | 14.7   | 100      | 679    |
| 急性心筋梗塞        | Killip I    | 2.8    | 4        | 145    |
|               | Killip II   | 0.0    | 0        | 46     |
|               | Killip III  | 54.5   | 6        | 11     |
|               | Killip IV   | 59.4   | 19       | 32     |
|               | 不明          | 7.7    | 1        | 13     |
|               | 全体          | 12.1   | 30       | 247    |
| 肺炎            | 軽症          | 1.2    | 5        | 424    |
|               | 中等症         | 4.4    | 7        | 160    |
|               | 重症          | 11.1   | 90       | 814    |
|               | 不明          | 0.0    | 0        | 542    |
|               | 全体          | 5.3    | 102      | 1940   |
| 喘息            | 重症度の指標なし    | 0.0    | 0        | 471    |
|               | 不明          | N/A    | 0        | 0      |
|               | 全体          | 0.0    | 0        | 471    |
| 脳梗塞           | JCS 0-1     | 2.6    | 15       | 578    |
|               | JCS 2-3     | 7.3    | 12       | 164    |
|               | JCS 10-100  | 25.0   | 22       | 88     |
|               | JCS 200-300 | 78.6   | 11       | 14     |
|               | 不明          | 11.1   | 2        | 18     |
|               | 全体          | 7.2    | 62       | 862    |
| 脳出血           | JCS 0-1     | 2.4    | 3        | 126    |
|               | JCS 2-3     | 1.5    | 1        | 66     |
|               | JCS 10-100  | 22.2   | 16       | 72     |
|               | JCS 200-300 | 54.9   | 28       | 51     |
|               | 不明          | 22.2   | 2        | 9      |
|               | 全体          | 15.4   | 50       | 324    |
| 糖尿病           | 重症度の指標なし    | 0.8    | 5        | 591    |
|               | 全体          | 0.8    | 5        | 591    |
| 大腿骨頸部骨折       | 重症度の指標なし    | 0.7    | 3        | 412    |
|               | 全体          | 0.7    | 3        | 412    |
| 胃潰瘍           | 重症度の指標なし    | 0.0    | 0        | 131    |
|               | 全体          | 0.0    | 0        | 131    |
| 急性腸炎          | 重症度の指標なし    | 0.0    | 0        | 628    |
|               | 全体          | 0.0    | 0        | 628    |

# ■ 死亡率(重症度別)【第1四半期】

H29/02/07

|           |          | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 急性虫垂炎     | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 398    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 398    |
| 胆石症       | 重症度の指標なし | 1.1    | 10       | 899    |
|           | 全体       | 1.1    | 10       | 899    |
| 前立腺肥大症    | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 94     |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 94     |
| 白内障       | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 1312   |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 1312   |
| 痔核        | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 64     |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 64     |
| 子宮筋腫      | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 182    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 182    |
| 狭心症       | 重症度の指標なし | 0.2    | 3        | 1350   |
|           | 全体       | 0.2    | 3        | 1350   |
| 腎結石及び尿管結石 | 重症度の指標なし | 0.4    | 1        | 270    |
|           | 全体       | 0.4    | 1        | 270    |
| 乳房の悪性新生物  | ステージ0    | 0.0    | 0        | 18     |
|           | ステージⅠ    | 0.0    | 0        | 56     |
|           | ステージⅡ    | 1.0    | 1        | 102    |
|           | ステージⅢ    | 0.0    | 0        | 5      |
|           | ステージⅣ    | 9.3    | 4        | 43     |
|           | 不明       | 4.0    | 8        | 199    |
|           | 全体       | 3.1    | 13       | 423    |
| 膝関節症      | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 245    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 245    |
| 鼠径ヘルニア    | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 504    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 504    |