

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

H30/06/06

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	4
	ステージⅠ	0.7	1	140
	ステージⅡ	13.8	4	29
	ステージⅢ	4.8	2	42
	ステージⅣ	14.8	16	108
	不明	17.5	31	177
	全体	10.8	54	500
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	20
	ステージⅠ	2.9	1	35
	ステージⅡ	1.4	1	69
	ステージⅢ	2.7	3	110
	ステージⅣ	9.2	12	130
	不明	6.5	14	216
	全体	5.3	31	580
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージⅠ	2.6	1	38
	ステージⅡ	0.0	0	29
	ステージⅢ	3.8	3	80
	ステージⅣ	7.0	6	86
	不明	9.4	13	139
	全体	6.1	23	378
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	5.8	3	52
	ステージⅡ	3.0	1	33
	ステージⅢ	7.6	7	92
	ステージⅣ	13.9	27	194
	不明	19.2	54	281
	全体	14.1	92	652
急性心筋梗塞	KillipⅠ	2.4	3	124
	KillipⅡ	2.0	1	49
	KillipⅢ	17.6	3	17
	KillipⅣ	55.6	20	36
	不明	50.0	4	8
	全体	13.2	31	234
肺炎	軽症	2.3	12	514
	中等症	9.9	23	233
	重症	13.7	141	1030
	不明	0.0	0	328
	全体	8.4	176	2105
喘息	重症度の指標なし	0.5	1	189
	全体	0.5	1	189
脳梗塞	JCS 0-1	1.4	8	575
	JCS 2-3	7.7	13	169
	JCS 10-100	27.1	23	85
	JCS 200-300	68.2	15	22
	不明	N/A	0	0
	全体	6.9	59	851
脳出血	JCS 0-1	4.9	8	163
	JCS 2-3	3.7	2	54
	JCS 10-100	15.6	10	64
	JCS 200-300	57.9	22	38
	不明	N/A	0	0
全体	13.2	42	319	
糖尿病	重症度の指標なし	1.6	7	427
	全体	1.6	7	427
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.6	6	378
	全体	1.6	6	378
胃潰瘍	重症度の指標なし	4.9	6	122
	全体	4.9	6	122
急性腸炎	重症度の指標なし	0.5	2	408
	全体	0.5	2	408

■ 死亡率(重症度別)【第4四半期】

H30/06/06

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	267
	全体	0.0	0	267
胆石症	重症度の指標なし	0.7	5	670
	全体	0.7	5	670
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	96
	全体	0.0	0	96
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	724
	全体	0.0	0	724
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	62
	全体	0.0	0	62
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	99
	全体	0.0	0	99
狭心症	重症度の指標なし	0.1	1	896
	全体	0.1	1	896
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.4	1	226
	全体	0.4	1	226
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	8
	ステージI	0.0	0	33
	ステージII	0.0	0	68
	ステージIII	0.0	0	12
	ステージIV	4.5	1	22
	不明	5.4	7	129
	全体	2.9	8	272
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	186
	全体	0.0	0	186
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	347
	全体	0.0	0	347