

■誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率【年間】

（ハイファン）表記は、H30/6/7時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	H I T O 病院	あさざり病院	内科びろろ呼吸器科	院ひたちなか総合病	ホウエツツ病院	浦添総合病院	金光病院	金沢文庫病院	恵寿総合病院	光晴会病院	光生病院	広島共立病院	佐藤病院	埼玉協同病院	札幌厚生病院	市立秋田総合病院	市立川西病院	志村大宮病院	汐田総合病院	院宗像水光会総合病	織田病院	新葛飾病院	新小倉病院	真星病院	人吉医療センター	西岡病院	総合守谷第一病院	筑後市立病院	調布東山病院	袖心会病院	嶋田病院	東名厚木病院	同愛記念病院	那珂川病院	那覇市立病院	南多摩病院	南町田病院	南部病院	平成立石病院	宝塚第一病院	名古屋記念病院	練馬総合病院
誤嚥性肺炎患者数(人)	6,763	183	17	10	197	46	369	52	170	206	130	101	243	-	221	37	337	126	59	167	166	135	-	104	76	75	69	46	163	244	101	302	191	113	191	245	164	430	58	458	227	293	241
喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査を受けた患者数(人)	320	9	0	9	51	11	3	0	16	24	10	1	61	-	8	5	7	1	1	12	9	1	-	0	0	0	0	1	44	6	35	13	3	5	6	2	2	0	3	0	9	1	
誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率(%)	0.0	4.9	0.0	0.0	2.5	23.9	0.8	0.0	9.4	11.7	7.7	1.0	25.1	-	3.6	13.5	2.1	0.8	1.7	7.2	5.4	0.7	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	18.0	5.9	11.6	9.9	2.7	2.6	2.4	1.2	0.5	0.0	0.7	0.0	3.1	0.4	

