

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

H31/06/13

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージI	0.0	0	50
	ステージII	0.0	0	14
	ステージIII	5.6	1	18
	ステージIV	20.2	20	99
	不明	9.7	29	299
	全体	10.4	50	481
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	17
	ステージI	1.8	1	57
	ステージII	0.0	0	74
	ステージIII	2.5	3	122
	ステージIV	11.5	15	131
	不明	7.6	19	250
	全体	5.8	38	651
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージI	0.0	0	38
	ステージII	5.6	2	36
	ステージIII	3.9	3	76
	ステージIV	11.3	7	62
	不明	5.6	7	125
	全体	5.5	19	343
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージI	6.7	2	30
	ステージII	4.3	1	23
	ステージIII	4.3	2	47
	ステージIV	12.9	12	93
	不明	13.8	66	478
	全体	12.4	83	672
急性心筋梗塞	Killip I	2.4	3	125
	Killip II	17.4	8	46
	Killip III	0.0	0	17
	Killip IV	37.8	14	37
	不明	37.5	3	8
	全体	12.0	28	233
肺炎	軽症	3.0	15	506
	中等症	8.8	22	251
	重症	13.3	142	1064
	不明	0.9	2	219
	全体	8.9	181	2040
喘息	重症度の指標なし	1.3	2	152
	全体	1.3	2	152
脳梗塞	JCS 0-1	1.3	7	532
	JCS 2-3	7.5	15	199
	JCS 10-100	14.7	11	75
	JCS 200-300	48.1	13	27
	不明	N/A	0	0
	全体	5.5	46	833
脳出血	JCS 0-1	3.8	5	132
	JCS 2-3	10.3	7	68
	JCS 10-100	18.8	12	64
	JCS 200-300	63.5	33	52
	不明	N/A	0	0
	全体	18.0	57	316
糖尿病	重症度の指標なし	1.1	4	367
	全体	1.1	4	367
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.1	4	366
	全体	1.1	4	366
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	102
	全体	0.0	0	102
急性腸炎	重症度の指標なし	0.3	1	397
	全体	0.3	1	397

■ 死亡率(重症度別)【第4四半期】

H31/06/13

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.4	1	252
	全体	0.4	1	252
胆石症	重症度の指標なし	1.1	8	733
	全体	1.1	8	733
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	93
	全体	0.0	0	93
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	498
	全体	0.0	0	498
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	47
	全体	0.0	0	47
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	126
	全体	0.0	0	126
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	856
	全体	0.0	0	856
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	268
	全体	0.0	0	268
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージⅠ	0.0	0	9
	ステージⅡ	2.2	1	45
	ステージⅢ	0.0	0	7
	ステージⅣ	20.0	3	15
	不明	5.7	10	175
	全体	5.4	14	257
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	217
	全体	0.0	0	217
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	323
	全体	0.0	0	323