

# ■死亡率(重症度別)【第1四半期】

H31/06/13

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージⅠ	2.1	2	95
	ステージⅡ	3.1	1	32
	ステージⅢ	3.4	1	29
	ステージⅣ	15.0	18	120
	不明	9.4	33	350
	全体	8.7	55	629
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	23
	ステージⅠ	6.1	4	66
	ステージⅡ	3.2	3	95
	ステージⅢ	2.1	3	143
	ステージⅣ	6.2	10	162
	不明	9.1	23	253
	全体	5.8	43	742
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	10
	ステージⅠ	0.0	0	40
	ステージⅡ	0.0	0	31
	ステージⅢ	2.2	2	89
	ステージⅣ	4.0	4	99
	不明	7.0	10	143
	全体	3.9	16	412
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	5.6	3	54
	ステージⅡ	4.2	1	24
	ステージⅢ	8.1	6	74
	ステージⅣ	15.6	19	122
	不明	12.6	56	444
	全体	11.8	85	719
急性心筋梗塞	KillipⅠ	3.6	4	111
	KillipⅡ	6.7	4	60
	KillipⅢ	37.5	6	16
	KillipⅣ	38.5	10	26
	不明	64.3	9	14
	全体	14.5	33	227
肺炎	軽症	4.0	18	449
	中等症	7.6	13	172
	重症	13.7	110	804
	不明	0.0	0	195
	全体	8.7	141	1620
喘息	重症度の指標なし	0.5	1	204
	全体	0.5	1	204
脳梗塞	JCS 0-1	1.6	11	693
	JCS 2-3	4.4	8	181
	JCS 10-100	18.5	15	81
	JCS 200-300	27.8	5	18
	不明	N/A	0	0
	全体	4.0	39	973
脳出血	JCS 0-1	2.7	4	147
	JCS 2-3	9.7	7	72
	JCS 10-100	11.1	8	72
	JCS 200-300	71.1	32	45
	不明	N/A	0	0
	全体	15.2	51	336
糖尿病	重症度の指標なし	0.5	2	434
	全体	0.5	2	434
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.9	3	351
	全体	0.9	3	351
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.7	2	121
	全体	1.7	2	121
急性腸炎	重症度の指標なし	0.4	2	476
	全体	0.4	2	476

# ■ 死亡率(重症度別)【第1四半期】

H31/06/13

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	327
	全体	0.0	0	327
胆石症	重症度の指標なし	0.9	7	823
	全体	0.9	7	823
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	68
	全体	0.0	0	68
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	756
	全体	0.0	0	756
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	75
	全体	0.0	0	75
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	115
	全体	0.0	0	115
狭心症	重症度の指標なし	0.2	2	1113
	全体	0.2	2	1113
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	1.1	3	264
	全体	1.1	3	264
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージⅠ	0.0	0	22
	ステージⅡ	0.0	0	44
	ステージⅢ	0.0	0	11
	ステージⅣ	22.2	4	18
	不明	4.8	9	188
	全体	4.6	13	285
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	244
	全体	0.0	0	244
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.2	1	461
	全体	0.2	1	461