

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

H31/06/13

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージⅠ	1.9	1	52
	ステージⅡ	0.0	0	12
	ステージⅢ	10.5	2	19
	ステージⅣ	25.9	28	108
	不明	8.0	27	339
	全体	10.9	58	533
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	21
	ステージⅠ	0.0	0	58
	ステージⅡ	3.5	3	86
	ステージⅢ	1.4	2	139
	ステージⅣ	8.9	15	169
	不明	10.1	32	316
	全体	6.6	52	789
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	7
	ステージⅠ	0.0	0	47
	ステージⅡ	2.3	1	43
	ステージⅢ	4.0	3	75
	ステージⅣ	9.3	10	108
	不明	7.8	12	154
	全体	6.0	26	434
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	5.7	3	53
	ステージⅡ	12.5	3	24
	ステージⅢ	4.8	3	63
	ステージⅣ	10.7	13	121
	不明	14.6	76	519
	全体	12.6	98	780
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1.6	2	122
	KillipⅡ	5.9	3	51
	KillipⅢ	12.5	2	16
	KillipⅣ	50.0	17	34
	不明	35.7	5	14
	全体	12.2	29	237
肺炎	軽症	2.3	11	472
	中等症	8.0	15	188
	重症	12.5	98	784
	不明	0.4	1	257
	全体	7.3	125	1701
喘息	重症度の指標なし	0.9	2	229
	全体	0.9	2	229
脳梗塞	JCS 0-1	1.6	11	687
	JCS 2-3	6.5	11	169
	JCS 10-100	19.8	16	81
	JCS 200-300	46.2	6	13
	不明	N/A	0	0
	全体	4.6	44	950
脳出血	JCS 0-1	5.4	8	147
	JCS 2-3	7.8	4	51
	JCS 10-100	7.3	4	55
	JCS 200-300	54.5	30	55
	不明	N/A	0	0
	全体	14.9	46	308
糖尿病	重症度の指標なし	0.8	3	362
	全体	0.8	3	362
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2.7	8	299
	全体	2.7	8	299
胃潰瘍	重症度の指標なし	4.8	5	105
	全体	4.8	5	105
急性腸炎	重症度の指標なし	0.6	3	498
	全体	0.6	3	498

■ 死亡率(重症度別)【第2四半期】

H31/06/13

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.3	1	376
	全体	0.3	1	376
胆石症	重症度の指標なし	0.6	5	895
	全体	0.6	5	895
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	78
	全体	0.0	0	78
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	717
	全体	0.0	0	717
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	68
	全体	0.0	0	68
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	122
	全体	0.0	0	122
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	1038
	全体	0.0	0	1038
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	299
	全体	0.0	0	299
乳房の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	0.0	0	18
	ステージⅡ	0.0	0	52
	ステージⅢ	0.0	0	7
	ステージⅣ	6.9	2	29
	不明	6.1	11	181
	全体	4.5	13	287
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	249
	全体	0.0	0	249
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	525
	全体	0.0	0	525