

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

2020/06/23

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	4
	ステージI	0.0	0	222
	ステージII	3.7	2	54
	ステージIII	4.4	2	45
	ステージIV	18.5	22	119
	不明	23.7	57	241
	全体	12.1	83	685
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	43
	ステージI	0.0	0	102
	ステージII	2.2	3	138
	ステージIII	2.6	4	155
	ステージIV	10.1	18	178
	不明	12.0	38	316
	全体	6.8	63	932
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	13
	ステージI	0.0	0	51
	ステージII	0.0	0	49
	ステージIII	2.0	2	102
	ステージIV	1.9	2	104
	不明	13.6	27	199
	全体	6.0	31	518
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージI	2.4	2	84
	ステージII	0.0	0	37
	ステージIII	5.9	5	85
	ステージIV	13.9	32	231
	不明	22.0	99	449
	全体	15.5	138	888
急性心筋梗塞	Killip I	2.3	4	173
	Killip II	4.6	3	65
	Killip III	31.6	6	19
	Killip IV	42.5	17	40
	不明	34.3	12	35
	全体	12.7	42	332
肺炎	軽症	3.8	22	575
	中等症	9.3	23	248
	重症	14.0	143	1021
	不明	0.0	0	240
	全体	9.0	188	2084
喘息	重症度の指標なし	0.7	2	305
	全体	0.7	2	305
脳梗塞	JCS 0-1	1.9	21	1081
	JCS 2-3	5.6	21	375
	JCS 10-100	14.2	17	120
	JCS 200-300	35.5	11	31
	不明	N/A	0	0
	全体	4.4	70	1607
脳出血	JCS 0-1	2.5	7	283
	JCS 2-3	4.7	5	106
	JCS 10-100	5.3	5	95
	JCS 200-300	66.7	46	69
	不明	N/A	0	0
	全体	11.4	63	553
糖尿病	重症度の指標なし	0.2	1	510
	全体	0.2	1	510
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.4	8	553
	全体	1.4	8	553
胃潰瘍	重症度の指標なし	4.8	7	147
	全体	4.8	7	147
急性腸炎	重症度の指標なし	1.1	5	465
	全体	1.1	5	465

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

2020/06/23

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	419
	全体	0.0	0	419
胆石症	重症度の指標なし	1.2	13	1124
	全体	1.2	13	1124
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	139
	全体	0.0	0	139
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1159
	全体	0.0	0	1159
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	85
	全体	0.0	0	85
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	193
	全体	0.0	0	193
狭心症	重症度の指標なし	0.1	2	1473
	全体	0.1	2	1473
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.8	3	385
	全体	0.8	3	385
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	28
	ステージI	0.0	0	151
	ステージII	0.0	0	111
	ステージIII	0.0	0	33
	ステージIV	9.4	3	32
	不明	16.1	23	143
	全体	5.2	26	498
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	347
	全体	0.0	0	347
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	534
	全体	0.0	0	534