

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

2025/01/16

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---------------|-------------|--------|----------|--------|
| 胃の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 9 |
| | ステージI | 2.5 | 3 | 121 |
| | ステージII | 6.5 | 2 | 31 |
| | ステージIII | 6.4 | 3 | 47 |
| | ステージIV | 12.2 | 9 | 74 |
| | 不明 | 15.9 | 40 | 251 |
| | 全体 | 10.7 | 57 | 533 |
| 結腸の悪性新生物 | ステージ0 | 2.2 | 1 | 46 |
| | ステージI | 0.0 | 0 | 66 |
| | ステージII | 0.8 | 1 | 120 |
| | ステージIII | 0.0 | 0 | 104 |
| | ステージIV | 12.6 | 13 | 103 |
| | 不明 | 8.9 | 28 | 315 |
| | 全体 | 5.7 | 43 | 754 |
| 直腸の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 6 |
| | ステージI | 2.4 | 1 | 41 |
| | ステージII | 0.0 | 0 | 41 |
| | ステージIII | 2.6 | 2 | 78 |
| | ステージIV | 7.1 | 5 | 70 |
| | 不明 | 10.8 | 17 | 157 |
| | 全体 | 6.4 | 25 | 393 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 12 |
| | ステージI | 2.5 | 4 | 160 |
| | ステージII | 2.9 | 2 | 69 |
| | ステージIII | 5.4 | 9 | 167 |
| | ステージIV | 10.4 | 28 | 268 |
| | 不明 | 14.1 | 64 | 454 |
| | 全体 | 9.5 | 107 | 1130 |
| 急性心筋梗塞 | Killip I | 1.3 | 2 | 158 |
| | Killip II | 6.1 | 7 | 114 |
| | Killip III | 22.7 | 5 | 22 |
| | Killip IV | 50.0 | 17 | 34 |
| | 不明 | 21.7 | 5 | 23 |
| | 全体 | 10.3 | 36 | 351 |
| 肺炎 | 軽症 | 3.6 | 21 | 577 |
| | 中等症 | 8.4 | 22 | 262 |
| | 重症 | 13.3 | 149 | 1117 |
| | 不明 | 0.0 | 0 | 375 |
| | 全体 | 8.2 | 192 | 2331 |
| 喘息 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 302 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 302 |
| 脳梗塞 | JCS 0-1 | 2.2 | 30 | 1346 |
| | JCS 2-3 | 6.5 | 33 | 511 |
| | JCS 10-100 | 15.3 | 21 | 137 |
| | JCS 200-300 | 40.5 | 17 | 42 |
| | 不明 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 5.0 | 101 | 2036 |
| 脳出血 | JCS 0-1 | 4.0 | 12 | 301 |
| | JCS 2-3 | 6.8 | 10 | 148 |
| | JCS 10-100 | 10.4 | 10 | 96 |
| | JCS 200-300 | 59.7 | 40 | 67 |
| | 不明 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 11.8 | 72 | 612 |
| 糖尿病 | 重症度の指標なし | 1.5 | 6 | 402 |
| | 全体 | 1.5 | 6 | 402 |
| 大腿骨頸部骨折 | 重症度の指標なし | 2.2 | 15 | 697 |
| | 全体 | 2.2 | 15 | 697 |
| 胃潰瘍 | 重症度の指標なし | 2.7 | 3 | 110 |
| | 全体 | 2.7 | 3 | 110 |
| 急性腸炎 | 重症度の指標なし | 0.4 | 2 | 552 |
| | 全体 | 0.4 | 2 | 552 |

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

2025/01/16

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 急性虫垂炎 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 591 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 591 |
| 胆石症 | 重症度の指標なし | 1.2 | 13 | 1067 |
| | 全体 | 1.2 | 13 | 1067 |
| 前立腺肥大症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 179 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 179 |
| 白内障 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 1378 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 1378 |
| 痔核 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 78 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 78 |
| 子宮筋腫 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 305 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 305 |
| 狭心症 | 重症度の指標なし | 0.1 | 2 | 1592 |
| | 全体 | 0.1 | 2 | 1592 |
| 腎結石及び尿管結石 | 重症度の指標なし | 0.4 | 2 | 499 |
| | 全体 | 0.4 | 2 | 499 |
| 乳房の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 8 |
| | ステージI | 0.0 | 0 | 69 |
| | ステージII | 3.5 | 3 | 85 |
| | ステージIII | 3.1 | 1 | 32 |
| | ステージIV | 5.6 | 1 | 18 |
| | 不明 | 7.8 | 8 | 103 |
| | 全体 | 4.1 | 13 | 315 |
| 膝関節症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 302 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 302 |
| 鼠径ヘルニア | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 691 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 691 |